



GUÍA DE TRATAMIENTOS DE LA VID Y PARRAL

...

GUÍA DE TRATAMIENTOS DE LA VID Y PARRAL

YESCA (<i>Stereum hirsutum</i>)	ESTADO A	ESTADO B	ESTADO C	ESTADO D	ESTADO E	ESTADO F	ESTADO G	ESTADO H	ESTADO I	ESTADO J					TRATAMIENTO PREVENTIVO Evitar las podas tempranas. Tratar las heridas de poda de forma tópica. Pued tratarse toda la planta en postpoda con
EUTIPIOSIS (<i>Eutypa armeniacae</i>)															
EXCORIOSIS (<i>Phomopsis viticola</i>)															Eficaces también contra MILDIU de primavera.
BLACK-ROT (<i>Guignardia bidwellii</i>)															
MILDIU (<i>Plasmopara viticola</i>)															
ANTRACNOSIS (<i>Gloeosporium ampelophagum</i>)															Seguir avisos de los S.P.V. Productos frenantes de BOTRYTIS.
OIDIO ó CENIZA (<i>Uncinula necator</i>)															
BOTRYTIS ó PODREDUMBRE GRIS (<i>Botrytis cinerea</i>)															Tratamientos dirigidos al racimo por ambos lados de la cepa. En casos de BOTRYTIS resistente a dicarboximidas utilizar SUMILAN® 25 WP a 1,5 Kg/ha.
NECROSIS BACTERIANA (<i>Xanthomonas ampelina</i>)															Tratar después de la cosecha si ésta se ha realizado mecánicamente y después de la poda en viñedos con problemas de NECROSIS o enfermedades de la madera.
PODREDUMBRE ACIDA															
ACARIOSIS (<i>Calgipitimerus vitis</i>)															Tratamiento acaricida
ACARO DE LA ROÑA (<i>Brevipalpus fovealis</i>)															
ARAÑA ROJA Y AMARILLA (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Eotetranychus</i>)															
PIRAL (<i>Sparganothis piferiana</i>)															Tratamiento eficaz contra polilla
GUSANO GRIS (<i>Agrotis segetum</i>)															
ALTICA (<i>Altica lythri</i>)															
CIGARRERO (<i>Ilycticus behulae</i>)															
POLILLAS (<i>Lobesia botrana</i>)															Seguir los avisos de los S.P.V. BACTUR® es un insecticida biológico. BACTUR® sólo controla POLILLAS. PITCH® controla LECANINOS, DIASPINOS y MARGARONIDOS.
MELAZO (<i>Pseudococcus citri</i>)															
(<i>Eulecanium</i> , <i>Pulvinaria</i>)															
CICADELIDOS (<i>Empoasca vitis</i>)															Seguir avisos de los S.P.V. Estos tratamientos son eficaces también contra POLILLAS al coincidir en el tiempo.
(<i>Scaphoideus titanus</i>)															
FLAVESCENCIA DORADA															
TRIPS s.p.															
MALAS HIERBAS															Si en el momento de aplicar el preemergente hay presencia de hierbas añadir LOGRADO® . Dosis según forma de aplicación (consultar).
NUTRICION FOLIAR															Casos graves de clorosis férrica pueden requerir aplicaciones al suelo de ESANTRENE® HP premier , FERRUM® XQ o HAMPIRON® HQ .